

1. 於正常的牙周結締組織中富含下列那種膠原蛋白?
  - a. 膠原蛋白 1,4
  - b. 膠原蛋白 2,4
  - c. 膠原蛋白 3,5
  - d. 膠原蛋白 1,3
2. Gingival fibers 分為三大組,何者不是?
  - a. Gingivodental group
  - b. Circular group
  - c. Horizontal group
  - d. Transseptal group
3. 下列何種組織結構只出現於口腔上皮而不會出現於接合上皮(junctional epithelium)?
  - a. Keratin
  - b. Desmosome
  - c. Hemidesmosome
  - d. Rete Pegs

ANS: d
4. 佔 alveolar bone 的有機基質中最多成份的是:
  - a. collagen
  - b. non-collagenous protein
  - c. fibronectin
  - d. glycoproteins
5. 牙周韌帶的寬度為?
  - a.  $0.1 \text{ mm} \pm 50\%$
  - b.  $0.25 \text{ mm} \pm 50\%$
  - c.  $0.5 \text{ mm} \pm 50\%$
  - d.  $0.7 \text{ mm} \pm 50\%$
6. 下列何種情形時，可施予夾板(splinting)及咬合調整(occlusal adjustment) ?
  - a. 因牙菌斑堆積而鬆動之牙齒
  - b. 剛經牙周手術而鬆動之牙齒
  - c. 維持期且口腔衛生良好，而牙齒鬆動時
  - d. 根管治療後鬆動之牙齒
7. 下列牙齦炎特徵中，何者正確 ?
  - a. 臨床出現牙齦炎時才有 GCF 流量增加
  - b. 費失 surface stippling 是牙齦炎的早期症狀
  - c. Stillman's Cleft 不是 pathologic pocket, 而是 trauma 的結果
  - d. 在中度與重度牙周炎時，在做探測(probing)時流血並不代表是 active tissue 破壞的症狀
8. Dilantin 是用於預防癲癇病人經樂(convulsion)，但亦會引起牙齦腫大(gingival enlargement)，以下敘述何者錯誤 ?
  - a. 發生率差別(3~65%)主要原因口腔衛生差異
  - b. 通常發生於服藥後 2~3 個月
  - c. 在腫大基質中，只有非細胞(acellular)成分增加
  - d. 在服藥前做好牙菌斑控制比腫大後在做牙菌斑控制，更可有效控制牙齦腫大
9. 妊娠期牙齦炎(pregnancy gingivitis)的有關敘述中，何者正確 ?
  - a. 牙齦炎是由懷孕本身赫爾蒙改變引起
  - b. pregnancy tumor 是 true neoplasm
  - c. pregnancy tumor 通常發生在懷孕後的第三個月或稍早些
  - d. 妊娠期牙齦炎時，唯一增加(具統計意義)的細菌是 spirochetes

10. 急性壞死性潰瘍性牙齦炎(ANUG)有關敘述中, 下列何者錯誤 ?  
 a. 早期觀察發現之 *Borrelia vincentii* 為 intermediate size 螺旋菌, 它不存在於病灶區表面  
 b. 與 ANUG 有關的主要細菌為 *P intermedia*  
 c. ANUG 的急性期患者血清內有對螺旋菌產生 IgG 及 IgM 抗體提高的現象  
 d. ANUG 患者未出現中性白血球趨化能力及吞噬能力下降的現象
11. Silness and Loe 的牙菌斑指數(plaque index)用以測 :  
 a. 牙冠上牙菌斑重量  
 b. 牙冠上接近牙齦處牙菌斑厚度  
 c. 牙冠上牙菌斑覆蓋範圍  
 d. 牙菌斑內革蘭氏陰性菌的數量
12. 以 CPITN (Community periodontal index of treatment need) 做牙周病流行病學調查, 所使用之探針是下列何者 ?  
 a. William / Fox probe  
 b. Naber probe  
 c. Sickle probe  
 d. WHO probe
13. Which one is calculus the most contribute factor for periodontitis?  
 a. Mechanical irritation  
 b. Attached by plaque  
 c. Aesthetic  
 d. Food impaction
14. Where do the supragingiva calculus most easily produce?  
 ① Upper molar lingual side ② Upper molar buccal side ③ Lower anterior lingual side ④ Lower anterior buccal side  
 a. ①③  
 b. ①④  
 c. ②③  
 d. ②④
15. Which bacteria is rarely seen in the deep part of the periodontal pocket?  
 a. Fusiform bacateria  
 b. Spirochetes  
 c. Filamentous bacteria  
 d. Motile rods
16. What kind of bacteria reduce during experimental gingivitis?  
 a. Gram positive cocci, rod  
 b. Gram negative cocci, rod  
 c. Anaerobic bacteria  
 d. Spirochetes
17. Which one is wrong for *Porphyromonas gingivalis*?  
 a. Gram negative, anaerobic, motile rod  
 b. Black-pigmentating bacteria  
 c. Produce toxic metabolism  
 d. Inhibit PMN digest
18. Which one is not gram negative?  
 a. *Peptostreptococcus micros*  
 b. *Porphyromonas gingivalis*  
 c. *Actinobacillus actinomycetemcomitans*  
 d. *Bacteroides forsythus*,

19. 妊娠期牙齦炎 (pregnancy gingivitis) 的有關敘述中，何者正確？  
a. 牙齦炎是由懷孕本身賀爾蒙改變引起的  
b. 所謂的 pregnancy tumor 是 true neoplasm  
c. pregnancy tumor 通常發生於懷孕後的第三個月或稍早些  
d. 妊娠期牙齦炎時，唯一增加（據統計意義）的細菌為 spirochets.
20. 妊娠性牙齦炎(pregnancy gingivitis)的牙齦發炎現象由懷孕第幾個月開始較明顯？第幾個月發炎現象最厲害？  
a. 第 3 個月開始，第 7 個月最厲害  
b. 第 4 個月開始，第 8 個月最厲害  
c. 第 5 個月開始，第 9 個月最厲害  
d. 第 2 個月開始，第 8 個月最厲害
21. 對於慢性牙周炎患者之兩大危險因子(risk factor)為？  
a. 不適當的牙菌斑控制習慣、糖尿病  
b. 不適當的牙菌斑控制習慣、抽煙  
c. 不適當的牙菌斑控制習慣、骨質疏鬆  
d. 不適當的牙菌斑控制習慣、心血管疾病
22. 第二型糖尿病患者較正常人之牙周狀態敘述何者為誤？  
a. 2.8 倍之牙周囊袋探測深度  
b. 3.4 倍之臨床附連喪失  
c. 2.8 倍之牙齦萎縮  
d. 3.4 倍之放射線齒槽骨破壞
23. 一種系統性疾病，病人有頭顱骨狹窄，乳牙早期脫落，牙齒喪失並無伴隨牙齦發炎情形，且牙骨質形成受到降低，指的是下列何種疾病？  
a. Chediak-Higashi syndrome  
b. Papillon Lefevre syndrome  
c. Leukocyte adhesion deficiency  
d. Hypophosphatasia
24. Down syndrome 的患者，有較高的牙周病普及率(prevalence)，多半在幾歲前即可見？  
a. 50  
b. 45  
c. 40  
d. 30
25. 當患有 primary neutrophil disorders 時，常會伴隨著嚴重的牙周炎。下列哪一種疾病為非？  
a. agranulocytosis  
b. neutropenia  
c. lazy leukocyte syndrome  
d. inflammatory bowel disease
26. McGuire 1991 establish prognosis. Which one is wrong?  
a. Good: adequate bone support, adequate to control etiologic factors, adequate patient cooperation  
b. Fair: less than adequate remaining bone support, some tooth mobility, grade I furcation  
c. Poor: grade I, II furcation involvement, difficult to maintain areas and/or doubtful patient compliance  
d. Hopeless: advances bone loss, grade II and III furcation involvement, tooth mobility

27. Tooth morphology is one key point for prognosis for individual teeth. Which one is wrong?
- Maxillary first molars furcal aspect of the root is concave in 31% of MB roots, 97% of DB roots, 17% of P roots
  - Furcation entrance is narrower than a standard curette in 58% of first molars
  - Root concavities in mandibular first molars, concavity of the furcal aspect was found in 100% M roots and 99% D roots
  - Concavities appear more marked in maxillary first premolars, MB roots of maxillary first molar, both roots of the mandibular first molars, and mandibular incisors
28. Which one is wrong?
- Pocket probing: probing forces of 0.25 N have been found to be well tolerated and accurate
  - Bleeding on probing: probe is carefully introduced to the bottom of the pocket and gently moved laterally along the pocket wall, clinician should recheck for bleeding 30 to 60 seconds
  - Amount of attached gingival: stretching lip or cheek to demarcate the mucogingival line while pocket is probed
  - Suppuration: ball of index finger is placed along the lateral aspect of the marginal gingival, and pressure is applied in a rolling motion toward the crown
29. 牙齒的 fremitus 之測量，下列何者正確？
- 用 periotest
  - Florida probe
  - 用食指放在要測之牙齒頰側，要病人牙齒作前突及側方磨牙動作
  - 目測
30. Aggressive periodontitis 使用下列何種抗生素比較可能治好此疾病？
- Amoxicillin + metronidazole
  - Amoxicillin + tetracycline
  - Clindamycin + metronidazole
  - Erythromycin + tetracycline
31. 牙根整平術 (Root planing) 之目的，不包括下列何者？
- 去除牙齦下的牙結石
  - 去除含有內毒素 (Endotoxin) 的牙骨質
  - 建立一個平滑的牙根表面
  - 去敏感 (Desensitization)
32. 下列哪一種化學性藥物對菌斑的控制最有效？
- Triclosan
  - Phenoloc compound
  - Chlorhexidine
  - Fluoride
33. 結石刮除與牙根整平後，多久牙齦溝可再上皮化？
- 1~2 星期
  - 2~3 星期
  - 3~4 星期
  - 4~5 星期
34. 據葛氏刮匙 (Gracey curettes) 之設計，可同時應用於前牙區與後牙區小白齒之型號應為下列何者？
- No.1-2
  - No.3-4
  - No.5-6
  - No.7-8

35. 根據 Waehaug 之研究，牙周囊袋超過多深，以牙根整平術治療就無法完全消除牙根表面之牙結石？

- a. 1 毫米
- b. 2 毫米
- c. 3 毫米
- d. 5 毫米

36. 磨銳葛氏刮匙(Gracey curettes)時，刮匙與磨石之角度應保持多少度？

- a. 45°左右
- b. 90°左右
- c. 100°至 110°左右
- d. 135°左右

37. 依據 Miller 1985 牙齦萎縮的分類，下列哪一種分類是牙根覆蓋術所難以達成的？

- a. class I
- b. class II
- c. class III
- d. class IV

38. 下列何者非牙周手術的 contra-indication？

- a. lack of patient cooperation
- b. 病人一個月前因 myocardial infarction 發作住院
- c. acute leukemia
- d. smoking

39. Graft transferred between genetically dissimilar members of the same species should called

- a. autogenous graft
- b. allogeneic graft
- c. xenogeneic graft
- d. alloplastic materials

40. Which is not the purpose of the periodontal surgery？

- a. access for root planing and scaling
- b. create a gingival morphology for patient self-plaque control
- c. regenerate of periodontal attachment
- d. pocket depth elimination

41. 下列何者為 apicallypositioned flap procedure 之特徵？

- a. minimum pocket depth postoperatively
- b. exposure of root surface
- c. maintain attached gingival
- d. postsurgical bone loss is massive

42. According to Norland & Tarnow(1998), the tip of the interdental papilla located between interproximal CEJ and contact point should be

- a. normal
- b. class I
- c. class II
- d. class III

43. Which is not the factor affecting the outcome of GTR in furcations？

- a. horizontal pocket depth
- b. anatomy of furcations in terms of height, width, depth
- c. gingival tissue thickness
- d. intrabony defects

44. 牙周病的患者，做完何種治療後，需進入維持期（maintenance stage），以防止疾病復發？  
a. 教導口腔衛生清潔及全口牙結石清除術後  
b. 手術期（surgical stage）完成後  
c. 假牙製作完成後  
d. 再評估（Re-evaluation）
45. 牙周病患者已經完成牙周治療後進入維持期(Maintenance stage)，在沒有特殊情況之下，需要多久時間定期回診？  
a. 一個月  
b. 二個月  
c. 三個月  
d. 六個月
46. 牙周病已成功治療後，若沒有定期回診，其牙周炎的復發機率是定期回診的幾倍？  
a. 1-2 倍  
b. 3-4 倍  
c. 5-7 倍  
d. 大於八倍
47. 牙周病的復發與何者影響最大？  
a. 年齡  
b. 性別  
c. 牙菌斑控制（plaque control）  
d. 糖尿病
48. 若牙周病已進入支持性牙周治療第一年，而患者牙齒有牙根分叉侵犯及牙冠牙根比例不良，則需多久時間定期回診？  
a. 1 星期  
b. 1-2 個月  
c. 3 個月  
d. 半年
49. 治療植體周圍炎時，下列操作步驟何為誤？  
a. 以塑膠刮勺（curette）清除植體表面  
b. 以超音波洗牙機較易清洗植體螺紋及細微表面  
c. 以橡膠杯(rubber cup)沾浮石粉(pumice)清洗牙冠部分  
d. 以 0.2% Chlorhexidine 沖洗植體表面
50. 下列敘述何者為是？  
a. 抽煙已被視為牙周病復發之第六危險因子  
b. 吸煙將會對牙根整平術後之牙周組織癒合沒有影響  
c. 嚼食菸草並不會影響牙周手術後的傷口癒合  
d. 吸煙量的多寡對牙周病的傷口的影響是不變的

問答題 (100%)

1. 寫出三種應用在固定補綴物的彈性印模材，並討論其優缺點。 (20%)
2. 舉例說明兩種製作臨時牙冠的樹脂材料和材料特性。 (20%)
3. 簡述金屬陶瓷牙冠使用的非貴金屬， Ni-Cr 合金或 Co-Cr 合金，加入鉻( Be )的主要理由。 (10%)
4. 請解釋金屬陶瓷牙冠牙橋所使用合金的分類，並且在每一類合金舉兩例商品。 (20%)
5. 技工室製作金屬陶瓷牙橋時，為什麼要使用磷酸結合包埋粉( Phosphate-boinvestment )包埋蠟型？ (10%)
6. 列出目前市面上常用的全瓷系統( all-ceramic system )和製作方法。 (20%)